Ficha Técnica del Producto

Fungicida sistémico-concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTES ACTIVOS:
Tebuconazole.....225 g/l
Triadimenol .....75 g/l

MODO DE EMPLEO: Las aplicaciones se realizarán con equipo manual, mochilla de motor o por avión. A fin de conseguir una solución homogénea, mezclar la dosis recomendada del producto en 12 - 14 litros de aceite agrícola y agitar 10 - 15 minutos. También se pueden realizar mezclas en emulsión agua-aceite.

COMPATIBILIDAD: Se puede mezclar con otros plaguicidas del mercado. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cunado se lo use en mezclas con otros plaguicidas en aceite agrícola.

PRECAUCIONES: Este producto puede ser NOCIVO si se ingiere, VENENOSO si se inhala. Puede provocar efecto irritante en los ojos. Durante la preparación y aplicación del producto NO COMER, BEBER O FUMAR, EVITAR la inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada así como el contacto del producto con la boca, ojos y piel. USAR ropa de protección adecuada: guantes, mascarilla, gafas y botas de caucho. DESPUÉS DEL USO, lavar el equipo utilizado, mantenerlo en buenas condiciones cuidando que no se produzcan escapes. ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

FRASES DE ADVERTENCIA:
• No contaminar cuerpos de agua (acequias, ríos, canales, etc).
• Conservar el producto en el envase original y cerrado herméticamente.
• No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para consumo humano o animal.
• Su transporte no se efectuará junto con medicinas ni forrajes.
• Antes de destruir el envase, enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido), tres veces y vierta los residuos en el equipo de aspersión (aplicación).
• Entregar los envases al distribuidor para la disposición final.
• En caso de derrame recoger el producto y enterrarlo en un lugar seguro.
• No utilice el envase para ningún otro fin.
• No efectuar las aspersiones cerca de reservas de agua potable.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:
En caso de intoxicación accidental por:

Inhalación: Sacar al paciente a un lugar con aire fresco. De ser necesario proporcionarle aire artificial. Mantenerlo en reposo.
Ingestión: Accidental, si la persona está consciente provocar vómito dando de beber agua en suficiente cantidad, introduciendo el dedo en la garganta. Repetir la operación hasta que el vómito tenga un color claro.
Contacto con la piel: Retirar de inmediato la ropa contaminada o impregnada. Lavar la piel de inmediato y jabón abundante por mínimo 20 minutos.
Contacto con los ojos: Manteniendo los párpados abiertos lavar con abundante agua durante 15 minutos.
Consultar con un médico y mostrarle la etiqueta.

12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Edificio Plaza 2000 Piso 12 y 13
Quito – Ecuador
Telf.: 2567581 2567984 Fax: 2558829

Ficha Técnica del Producto

SÍNTOMAS DE DIAGNÓSTICO: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.
TRATAMIENTO: No se conoce antídoto específico por lo tanto su tratamiento es sintomático.
En caso de intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo Noboa Montalvo, teléfonos: (04)2567 500 – 2563 500. Receptor 34334. Celular 09-9426154.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	ENFERMEDAD	DOSIS l/ha
BANANO *Musa* spp	Sigatoka negra *Mycosphaerella fijiensis*	0.4

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En banano según la época y presión de la enfermedad, se puede aplicar a intervalos de 21 a 25 días, aplicando de 6 a 8 ciclos por año. En rosas SIL**VACUR COMBI 300 EC** puede ser utilizado en cualquier época del año con la frecuencia que determine la presión de la enfermedad.
En tomate **SILVACUR COMBI 300 EC** debe aplicarse cuando se detecten los primeros síntomas en las plantas.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

INTERVALO DE SEGURIDAD: El período de carencia es de 10 días en banano y rosas y de 15 días en tomate.

PRESENTACIÓN:
Envase x 1 litro

REGISTRO MAGAP: 109-F 1-SESA-U

Elaborador por: BAYER CROPSCIENCE S.A.
Distribuido por: BAYER S.A.